
























	Périodes de traitement	Période principale	Principaux bioagresseurs visés		Catégories de produits utilisés
			Maladies	Illustration	
GRANDES CULTURES HIVER: Colza, Céréales à pailles, Pois protéagineux, Pois chiche, fève, Lentille.	Aout à Juillet	MI septembre à fin mai	Oïdiums		Fongicides incluant des produits de biocontrôle.
			Ascochyte		
			Rouilles		
			Fusarioses		
			Septorioses		
			Piétin échaudage		



Crédit photos arvalis, terresinovia, CA34

	Périodes de traitement	Période principale	Principaux bioagresseurs visés		Catégories de produits utilisés	
			Ravageurs	Illustration		
<p>GRANDES CULTURES HIVER: Colza, Céréales à pailles, Pois protéagineux, Pois chiche, fève, Lentille.</p>	Aout à Juillet	MI septembre à fin mai	Altises (petite et grosse)		Insecticides incluant des produits de biocontrôle.	
			Taupins			
			Zabres			
			Limaces	<p>Limace grise ou loche</p>  <p>Couleur gris beige d'une taille de 4 à 5 cm</p> <p>Limace noire</p>  <p>Couleur noire d'une taille de 2,5 à 4 cm</p>		
			Charançons			
			Pucerons			
			Bruches			
			Héliothis			







Crédit photos arvalis, terresinovia, CA34

	Périodes de traitement	Période principale	Principaux bioagresseurs visés		Catégories de produits utilisés
			Cible	Illustration	
GRANDES CULTURES HIVER: Colza, Céréales à pailles, Pois protéagineux, Pois chiche, fèverole, Lentille.	Aout à Juillet	MI septembre à fin mai	Graminées Annuelles		Herbicides incluant des produits de biocontrôle.
			Graminées Vivaces		
			Dicotylédones annuelles		
			Dicotylédones vivaces		





Crédit photos arvalis, terresinovia, CA34

	Périodes de traitement	Période principale	Principaux bioagresseurs visés		Catégories de produits utilisés
			Maladies	Illustration	
GRANDES CULTURES PRINTEMPS: Tournesol, soja, Sorgho, Maïs	Février à novembre	Mars à septembre	Mildious		Fongicides incluant des produits de biocontrôle.
			Sclérotinia		

Crédit photos arvalis, terresinovia, CA34

	Périodes de traitement	Période principale	Principaux bioagresseurs visés		Catégories de produits utilisés
			Ravageurs	Illustration	
GRANDES CULTURES PRINTEMPS: Tournesol, soja, Sorgho, Maïs	Février à novembre	Mars à septembre	Limaces		Insecticides et ponctuellement acaricides, incluant des produits de biocontrôle.
			Taupins		
			Acariers		
			Héliotis		
			Pyrales		
			Noctuelles		

Crédit photos arvalis, terresinovia, CA34

	Périodes de traitement	Période principale	Principaux bioagresseurs visés		Catégories de produits utilisés
			Cible	Illustration	
GRANDES CULTURES PRINTEMPS: Tournesol, soja, Sorgho, Maïs	Février à novembre	Mars à septembre	Graminées Annuelles		Herbicides incluant des produits de biocontrôle.
			Graminées Vivaces		
			Dicotylédones annuelles		
			Dicotylédones vivaces		

Crédit photos arvalis, terresinovia, CA34